

престали да радите због пандемије.
Још увек сазнајемо како ће вакцине утицати на ширење COVID-19. Након што се у потпуности вакцинишете против COVID-19, требало би да наставите да предузимате мере предострожности на јавним местима, попут ношења маске, држања на раздаљини од 2 метра од других, избегавања гужве и слабо проветрених простора и често прање руку. Препоруке ће се ажурирати у складу са новим сазнањима.

ВАКЦИНА ПРОТИВ COVID-19 МОГУЋИ НЕЖЕЉЕНИ ЕФЕКТИ



Дом здравља
Крагујевац

ВАКЦИНА ПРОТИВ COVID-19 МОГУЋИ НЕЖЕЉЕНИ ЕФЕКТИ

Могући нежељени ефекти након примене вакцине против COVID-19

Вакцина против COVID-19 ће вам помоћи да се заштитите да добијете COVID-19. Можда ћете имати неке нежељене ефекте, што су уобичајени знаци да ваше тело изграђује заштиту. Ови нежељени ефекти могу утицати на вашу способност обављања свакодневних активности, али би требало да нестану за неколико дана. Неки људи немају нежељене ефекте.

Чести нежељени ефекти:

На руци на којој сте добили вакцину:

- Бол
- Црвенило
- Оток

У остатку тела:

- Умор
- Главобоља
- Бол у мишићима
- Температура
- Дрхтавица
- Мучнина

Шта ако имате нежељено дејство после вакцинације?

Разговарајте са својим лекаром о узимању лекова који се продају без рецепта, као што су ибупрофен, парацетамол или

антихистаминици, за било какав бол и нелагодност након вакцинације. Ове лекове можете узимати за ублажавање нежељених ефеката након вакцинације ако немате других медицинских разлога који вас спречавају да нормално узимате ове лекове. Не препоручује се узимање ових лекова пре вакцинације ради покушаја спречавања нежељених ефеката.

Да смањите бол и нелагодност тамо где сте добили вакцину:

Нанесите чисту, хладну, мокру крпу на место убода.

Користите или вежбајте руку.

Да бисте смањили нелагодност због грознице:

Пијте пуно течности.

Обуците се лагано.

Нежељени ефекти након друге дозе вакцине могу бити интензивнији од оних који сте имали након прве дозе. Ови нежељени ефекти су уобичајени знаци да ваше тело изграђује заштиту и требало би да нестану у року од неколико дана.

Када позвати доктора?

У већини случајева нелагодност од бола или грознице нормалан је знак да ваше тело гради заштиту. Обратите се свом лекару или здравственом раднику

- Ако се црвенило или осетљивост на месту на којем сте добили убод погоршају након 24

сата;

- Ако вас нежељени ефекти забрињавају или се чини да не нестају након неколико дана;
- Ако добијете COVID-19 вакцину и мислите да имате озбиљну алергијску реакцију након напуштања места вакцинације, потражите хитну медицинску помоћ позивом на 194.

Важно је да запамтите

Нежељени ефекти могу утицати на вашу способност обављања свакодневних активности, али би требало да нестану за неколико дана.

За све COVID-19 вакцине које су тренутно доступне у Републици Србији је потребно да се два пута вакцинишете како би се постигла највећа заштита против COVID-19. Требали бисте добити другу дозу, чак и ако имате нежељене ефекте након прве дозе вакцине, осим ако вам лекар не кажу да је не примате.

Потребно је да прође време да ваше тело изгради заштиту након било какве вакцинације. Људи се сматрају потпуно вакцинисанима две недеље након другог вакцинисања (ревакцине) после примене PhizerBioNtech или Sputnik V COVID-19 вакцине односно три недеље после ревакцине Sinopharm COVID-19 вакцином. Потребно је да наставите да користите све доступне мере да заштите себе и друге док се потпуно не вакцинишете (ношење маске, прање руку, дистанца од 2 метра).

Након што се у потпуности вакцинишете против COVID-19, можда ћете моћи да почнете да радите неке ствари које сте